

ノロウイルスによる食中毒に厳重な警戒をお願いします

本年は、昨年まで我が国で食中毒の原因となってきたG2-4の型に替わり、昨年からアジア圏で流行しているG2-17が主流になっています。

- 「感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防の啓発について」
(監視安全課事務連絡 平成27年10月23日)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/dl/151023-01.pdf
- 「ノロウイルスによる食中毒の予防について」
(平成27年9月30日付け食安監発0930第2号)
<http://www.mhlw.go.jp/file/06-SeisakuJouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/000098877.pdf>
- 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）」
(平成16年2月27日付け食安発第0227012号別添。最終改正；平成26年10月14日食安発1014第1号)
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082847.html>
- 「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成9年3月24日付け衛食第85号別添。最終改正：平成25年10月22日付け食安発1022第10号）
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-izen/gyousei/dl/131106_03.pdf
- 「ノロウイルスに関するQ&A」（平成16年2月4日付け事務連絡。最終改訂；平成27年6月30日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
- 「ノロウイルス食中毒対策について」（平成19年10月12日付け食安発第1012001）
<http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/s1012-5.html>